

门诊特定药品及“双通道”管理药品名单

序号	药品名称	备注	首自付比例
1	酒石酸艾格司他胶囊	限经 CYP2D6 基因型检测为弱代谢型(PMs)、中间代谢型(IMs)或快代谢型(EMs)的I型戈谢病(GD1)成年患者。	20%
2	芦曲泊帕片	限计划接受手术(含诊断性操作)的慢性肝病伴血小板减少症的成年患者。	20%
3	甲氧聚二醇重组人促红素注射液	限因慢性肾脏病引起的贫血,且正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者。	20%
4	恩那度司他片	限非透析的成人慢性肾脏病(CKD)患者。	20%
5	培莫沙肽注射液	限因慢性肾脏病引起的贫血,包括:1. 未接受红细胞生成刺激剂(ESA)治疗的成人非透析患者;2. 正在接受短效促红细胞生成素治疗的成人透析患者。	20%
6	奥磷布韦片	限基因 1、2、3、6 型成人慢性丙型肝炎。	10%
7	艾诺米替片	限艾滋病病毒感染。	20%
8	盐酸米托蒽醌脂质体注射液	限既往至少经过一线标准治疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤(PTCL)成人患者。	20%
9	泽贝妥单抗注射液	限 CD20 阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤,非特指性(DLBCL,NOS)成人患者。	20%
10	瑞帕妥单抗注射液	限国际预后指数(IPD)为 0~2 分的新诊断 CD20 阳性弥漫大 B 细胞性非霍奇金淋巴瘤(DLBCL)成人患者。	20%
11	曲妥珠单抗注射液(皮下注射)	限:1. HER2 阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗,支付不超过 12 个月;2. HER2 阳性的转移性乳腺癌。	20%
12	琥珀酸瑞波西利片	限激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌,与芳香化酶抑制剂联合用药作为女性患者的初始内分泌治疗。	20%
13	甲磺酸贝福替尼胶囊	限既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	20%
14	硫酸氢司美替尼胶囊	限 3 岁及 3 岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤(PN)的 I 型神经纤维瘤病(NF1)儿童患者。	20%
15	伏罗尼布片	限与依维莫司联合,用于既往接受过酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的晚期肾细胞癌(RCC)患者。	20%

序号	药品名称	备注	首自付比例
16	阿可替尼胶囊	限既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。	20%
17	恩曲替尼胶囊	限:1. 12岁及以上,经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶(NTRK)融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤;患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者,或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者;2. ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	20%
18	谷美替尼片	限具有间质-上皮转化因子(MET)外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。	20%
19	阿伐替尼片	限携带血小板衍生生长因子受体 α (PDGFRA)外显子18突变(包括PDGFRA D842V突变)的不可切除或转移性胃肠道间质瘤(GIST)成人患者。	20%
20	伊鲁阿克片	限既往接受过克唑替尼治疗后疾病进展或对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者。	20%
21	林普利塞片	限既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者。	20%
22	度维利塞胶囊	限既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者。	20%
23	塞利尼索片	限既往接受过治疗且对至少一种蛋白酶体抑制剂,一种免疫调节剂以及一种抗CD38单抗难治的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。	20%
24	磷酸索立德吉胶囊	限不宜手术或放疗,以及手术或放疗后复发的局部晚期基底细胞癌(BCC)成年患者。	20%
25	注射用醋酸曲普瑞林微球	限需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。	10%
26	注射用戈舍瑞林微球	限需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。	10%
27	艾贝格司亭 α 注射液	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	20%
28	拓培非格司亭注射液	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	20%
29	艾加莫德 α 注射液	限乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的成人全身型重症肌无力(gMG)患者。	20%
30	盐酸奥扎莫德胶囊	限成人复发型多发性硬化。	20%
31	依库珠单抗注射液	限:1. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)的患者;2. 非典型溶血性尿毒症综合征(aHUS)的患者;3. 抗乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的难治性全身型重症肌无力(gMG)成人患者。	20%
32	佩索利单抗注射液	限成人泛发性脓疱型银屑病(GPP)。	20%

序号	药品名称	备注	首自付比例
33	替瑞奇珠单抗注射液	限适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者。	20%
34	注射用司妥昔单抗	限人体免疫缺陷病毒(HIV)阴性和人疱疹病毒 8 型(HHV-8)阴性的多中心 Castleman 病(MCD)成人患者。	20%
35	萨特利珠单抗注射液	限 ≥ 12 岁青少年及成人患者水通道蛋白 4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)。	20%
36	西罗莫司凝胶	限成人和 6 岁及以上儿童患者的结节性硬化症相关面部血管纤维瘤。	20%
37	盐酸可乐定缓释片	限 6—17 岁儿童和青少年的注意缺陷多动障碍(ADHD)。	20%
38	盐酸替洛利生片	限发作性睡病成人患者。	20%
39	注射用奥马珠单抗 α	限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β_2 -肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的 15 岁及以上患者,并需 IgE(免疫球蛋白 E)介导确诊证据。	20%
40	奥马珠单抗注射液	限:1. 经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β_2 -肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的 6 岁及以上患者,并需 IgE(免疫球蛋白 E)介导确诊证据;2. H1 抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12 岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。	20%
41	氟轻松玻璃体内植入剂	限累及眼后段的慢性非感染性葡萄膜炎。	20%
42	蔗糖羟基氧化铁咀嚼片	限:1. 接受血液透析(HD)或腹膜透析(PD)的成人慢性肾脏病(CKD)患者;2. 12 岁及以上 CKD4—5 期(定义为肾小球滤过率 $< 30\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$)或接受透析的 CKD 儿科患者。	20%
43	淫羊藿素软胶囊	限不适合或患者拒绝接受标准治疗,且既往未接受过全身系统性治疗的、不可切除的肝细胞癌,患者外周血复合标志物满足以下检测指标的至少两项:AFP $\geq 400\text{ng}/\text{mL}$;TNF- $\alpha < 2.5\text{pg}/\text{mL}$;IFN- $\gamma \geq 7.0\text{pg}/\text{mL}$ 。	20%
44	尼替西农胶囊	限成人和儿童酪氨酸血症 I 型(HT-1)。	20%
45	曲氟尿苷替匹嘧啶片	限:既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗,以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子(VEGF)治疗、抗表皮生长因子受体(EGFR)治疗(RAS 野生型)的转移性结直肠癌(mCRC)患者。	20%
46	丁苯那嗪片	限亨廷顿病相关的舞蹈症。	20%

调整限定支付范围门诊特定药品名单

序号	药品名称	剂型	备注
1	玛巴洛沙韦片		限成人和 5 岁及以上儿童单纯性甲型和乙型流感患者,或存在流感相关并发症高风险的成人和 12 岁及以上儿童流感患者。
2	索磷维伏片		限既往接受过含直接抗病毒药物(DAA)方案、无肝硬化或伴代偿性肝硬化(Child-Pugh A)的成人慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。
3	达诺瑞韦钠片		限与盐酸拉维达韦片等联合用于治疗初治的非肝硬化的基因 1b 型慢性丙型肝炎成人患者。
4	盐酸拉维达韦片		限初治的基因 1b 型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者。
5	磷酸依米他韦胶囊		限与索磷布韦片联合,用于治疗成人基因 1 型非肝硬化慢性丙型肝炎。
6	苯环喹溴铵鼻喷雾剂		限变应性鼻炎。
7	注射用全氟丙烷人血白蛋白微球		
8	注射用全氟丁烷微球		限肝脏局灶性病变血管相和 Kupffer 相的超声成像。
9	环泊酚注射液		限:1. 非气管插管的手术/操作中的镇静和麻醉;2. 全身麻醉诱导和维持;3. 重症监护期间机械通气时的镇静。
10	注射用甲苯磺酸瑞马唑仑		限:1. 非气管插管手术/操作中的镇静和麻醉;2. 全身麻醉的诱导和维持。
11	水合氯醛/糖浆组合包装		限儿童检查、操作前的镇静、催眠。
12	司美格鲁肽注射液		限:1. 成人 2 型糖尿病患者的血糖控制:在饮食控制和运动基础上,接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人 2 型糖尿病患者;2. 降低伴有心血管疾病的 2 型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件(心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中)风险。
13	艾塞那肽注射液		限 2 型糖尿病。
14	利拉鲁肽注射液		限 2 型糖尿病。
15	二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)		

序号	药品名称	剂型	备注
16	艾米替诺福韦片		限慢性乙型肝炎成人患者。
17	恩替卡韦口服溶液		限慢性乙型肝炎成人患者或 2 岁至 <18 岁慢性 HBV 感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者。
18	海曲泊帕乙醇胺片		限:1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)成人患者;2. 对免疫抑制治疗(IST)疗效不佳的重型再生障碍性贫血(SAA)成人患者。
19	甲苯磺酸多纳非尼片		限:1. 既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者;2. 进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。
20	达可替尼片		限表皮生长因子受体(EGFR)19 号外显子缺失突变或 21 号外显子 L858R 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。
21	奥布替尼片		限:1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者;2. 既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者;3. 既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤(MZL)患者。
22	奥妥珠单抗注射液		限与化疗联合,用于初治的 II 期伴有巨大肿块、III 期或 IV 期滤泡性淋巴瘤成人患者,达到至少部分缓解的患者随后用奥妥珠单抗维持治疗。
23	阿齐沙坦片		
24	氨氯地平叶酸片(II)		限伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的原发性高血压。
25	氟唑帕利胶囊		限:1. 既往经过二线及以上化疗的伴有胚系 BRCA 突变(gBRCAm)的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的患者;2. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。
26	帕米帕利胶囊		限既往经过二线及以上化疗的伴有胚系 BRCA(gBRCA)突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。
27	阿贝西利片		限:1. 联合内分泌治疗(他莫昔芬或芳香化酶抑制剂)用于激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性、淋巴结阳性,高复发风险且 Ki-67 \geq 20%的早期乳腺癌成人患者的辅助治疗。2. 激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌:与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗;与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。
28	甲磺酸艾立布林注射液		限既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。

序号	药品名称	剂型	备注
29	马来酸奈拉替尼片		限人类表皮生长因子受体 2(HER2)阳性的早期乳腺癌成年患者,在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。
30	索凡替尼胶囊		限无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好(G1、G2)的胰腺和非胰腺来源的神经内分泌瘤。
31	达雷妥尤单抗注射液		限:1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者;2. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者;3. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者,患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。
32	泊马度胺胶囊		限既往接受过至少两种治疗(包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂),且在最后一次治疗期间或治疗结束后 60 天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。
33	阿帕他胺片		限:1. 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者;2. 有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。
34	达罗他胺片		限:1. 治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者;2. 联合多西他赛治疗转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者。
35	咪达唑仑口服溶液		限:1. 儿童诊断或治疗性操作前以及操作过程中的镇静/抗焦虑/遗忘;2. 儿童术前镇静/抗焦虑/遗忘。
36	诺西那生钠注射液		限 5q 脊髓性肌萎缩症。
37	氨吡啶缓释片		限多发性硬化合并步行障碍(EDSS 评分 4—7 分)的成年患者。
38	阿加糖酶 α 注射用浓溶液		限法布雷病(α-半乳糖苷酶 A 缺乏症)患者的长期酶替代治疗,适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在 0—6 岁儿童中的安全性和有效性。
39	甘露特钠胶囊		限轻度至中度阿尔茨海默病。
40	注射用利培酮微球(II)		限急性和慢性精神分裂症以及其他各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状。
41	注射用盐酸兰地洛尔		限:1. 手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗:心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速;2. 手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失常的紧急治疗:心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速;3. 心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗:心房纤颤、心房扑动。
42	海博麦布片		限饮食控制以外的辅助治疗,可单独或与 HMG-CoA 还原酶抑制剂(他汀类)联合用于治疗原发性(杂合子家族性或非家族性)高胆固醇血症。

序号	药品名称	剂型	备注
43	依洛尤单抗注射液		限:1. 降低心血管事件的风险:在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中,降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。通过:与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药,伴随或不伴随其他降脂疗法,或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中,单独用药或与其他降脂疗法联合用药;2. 原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常:可作为饮食的辅助疗法,用于成人原发性高胆固醇血症(杂合子家族性和非家族性)或混合型血脂异常患者的治疗,以降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平;在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中,与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药,或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中,单独用药或与其他降脂疗法联合用药;3. 纯合子型家族性高胆固醇血症:用于成人或12岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。可与饮食疗法和其他降低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)治疗(例如他汀类药物、依折麦布、LDL分离术)合用,用于患有纯合子型家族性高胆固醇血症(HoFH)且需要进一步降低LDL-C的患者。
44	阿利西尤单抗注射液		限:1. 心血管事件预防。在确诊为动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中,降低心肌梗死、卒中、需要住院的不稳定性心绞痛的风险。通过:与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药,伴随或不伴随其他降脂疗法,或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中,单独用药或与其他降脂疗法联合用药;2. 原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性)和混合型血脂异常:可作为饮食的辅助疗法,用于成人原发性高胆固醇血症(杂合子型家族性和非家族性)或混合型血脂异常患者的治疗,以降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平。在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中,与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药,或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中,单独用药或与其他降脂疗法联合用药。
45	环硅酸锆钠散		限成人高钾血症。
46	氯苯唑酸软胶囊		限成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病(ATTR-CM)。
47	克霉唑阴道膨胀栓		限念珠菌性外阴阴道病。
48	环孢素滴眼液(II)		限于眼症。
49	注射用泰它西普		限与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。
50	乌司奴单抗注射液		限:1. 对环孢素、甲氨蝶呤(MTX)等其他系统性治疗或PUVA(补骨脂素和紫外线A)不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者;2. 对其他系统性治疗或光疗应答不足或无法耐受的6岁及以上儿童和青少年(体重60公斤至100公斤)中重度斑块状银屑病患者;3. 对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。
51	乌司奴单抗注射液(静脉输注)		限对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF- α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。

序号	药品名称	剂型	备注
52	克立硼罗软膏		限 2 岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者。
53	依奇珠单抗注射液		限:1. 适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成人患者;2. 常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎成人患者。
54	艾曲泊帕乙醇胺片		限:1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和 6 岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者;2. 既往对免疫抑制治疗缓解不充分的重型再生障碍性贫血(SAA)患者。
55	地塞米松玻璃体内植入剂		限:1. 视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿;2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)。 应同时符合以下条件:1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05—0.5;3. 事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或 OCT(全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像)证据;4. 每眼累计最多支付 5 支,每个年度最多支付 2 支。
56	阿昔替尼片		
57	奥拉帕利片		限:1. 携带胚系或体细胞 BRCA 突变的(gBRCAm 或 sBRCAm)晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗;2. 同源重组修复缺陷(HRD)阳性的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗联合贝伐珠单抗治疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗;3. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗;4. 携带胚系或体细胞 BRCA 突变(gBRCAm 或 sBRCAm)且既往治疗(包括一种新型内分泌药物)失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者的治疗。
58	枸橼酸伊沙佐米胶囊		限治疗已接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成人患者。
59	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊		限:1. 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗;2. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。
60	甲磺酸阿帕替尼片		限:1. 既往至少接受过 2 种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃—食管结合部腺癌患者;2. 既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者;3. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。
61	来迪派韦索磷布韦片		限成人和 12 至<18 岁青少年的慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。
62	利奥西呱片		限:1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的 CTEPH,且(WHO FC)为 II—III 的患者;2. 动脉性肺动脉高压(PAH)且(WHO FC)为 II—III 患者的二线用药。

序号	药品名称	剂型	备注
63	磷酸芦可替尼片		限:1. 中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)(亦称为慢性特发性骨髓纤维化)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的成年患者;2. 对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的 12 岁及以上急性移植物抗宿主病(急性 GVHD,aGVHD)患者。
64	罗沙司他胶囊		限慢性肾脏病(CKD)引起的贫血。
65	马来酸吡咯替尼片		限:1. 表皮生长因子受体 2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者;2. 表皮生长因子受体 2(HER2)阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗。
66	索磷布韦维帕他韦片		限成人慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。
67	西达本胺片		限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤(PTCL)患者。
68	盐酸埃克替尼片		限:1. 表皮生长因子受体(EGFR)基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗;2. 既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC);3. II-III A 期伴有表皮生长因子受体(EGFR)基因敏感突变非小细胞肺癌(NSCLC)术后辅助治疗。
69	盐酸安罗替尼胶囊		限:1. 既往至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体(EGFR)基因突变或间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的患者,在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发;2. 腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗;3. 既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗;4. 具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗;5. 进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。
70	依维莫司片		限:1. 既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者;2. 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者;3. 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤(NET)成人患者;4. 需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症(TSC)相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA)成人和儿童患者;5. 不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者;6. 来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的激素受体阳性、表皮生长因子受体-2 阴性、绝经后晚期女性乳腺癌患者。
71	乙磺酸尼达尼布软胶囊		限:1. 特发性肺纤维化(IPF);2. 系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD);3. 具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病。

序号	药品名称	剂型	备注
72	泽布替尼胶囊		限:1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者;2. 成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者;3. 成人华氏巨球蛋白血症(WM)患者。
73	泊沙康唑口服混悬液		限:1. 预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染;2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病;3. 接合菌纲类感染。
74	阿柏西普眼内注射液		限:1. 50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害。应同时符合以下条件:1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05—0.5;3. 事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或 OCT(全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像)证据;4. 每眼累计最多支付 9 支,第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。
75	康柏西普眼用注射液		限:1. 50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3. 脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害;4. 继发于视网膜静脉阻塞(RVO)(视网膜分支静脉阻塞(BRVO)或视网膜中央静脉阻塞(CRVO)的黄斑水肿引起的视力损伤。 应同时符合以下条件:1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05—0.5;3. 事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或 OCT(全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像)证据;4. 每眼累计最多支付 9 支,第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。
76	地舒单抗注射液 (120mg/1.7mL/支)		
77	雷珠单抗注射液		限:1. 50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3. 脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害;4. 继发于视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿引起的视力损害。 应同时符合以下条件:1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05—0.5;3. 事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或 OCT(全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像)证据;4. 每眼累计最多支付 9 支,第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。
78	特瑞普利单抗注射液		限:1. 既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗;2. 含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗;3. 既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗;4. 局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗;5. 不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌的一线治疗;6. 表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗。

序号	药品名称	剂型	备注
79	替雷利珠单抗注射液		限:1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗;2. PD-L1 高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗;3. 不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗;4. 表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗;5. 表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者,以及 EGFR 和 ALK 阴性或未知的,既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性鳞状 NSCLC 成人患者;6. 至少经过一种全身治疗的肝细胞癌的治疗;7. 不可切除或转移性微卫星高度不稳定型(MSI-H)或错配修复基因缺陷型(dMMR)的成人晚期实体瘤患者;既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者;既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者;8. 既往接受过一线标准化疗后进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌的治疗;9. 复发或转移性鼻咽癌的一线治疗;10. PD-L1 高表达的局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗;11. 不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗。
80	信迪利单抗注射液		限:1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗;2. 非鳞状非小细胞肺癌:(1)表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗;(2)表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗失败的 EGFR 基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗;3. 不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗;4. 既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的一线治疗;5. 不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞癌的一线治疗;6. 不可切除的局部晚期、复发或转移性胃及胃食管交界处腺癌的一线治疗。
81	注射用奥马珠单抗		限:1. 经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β_2 -肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘的 6 岁及以上患者,并需 IgE(免疫球蛋白 E)介导确诊证据;2. H1 抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12 岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。
82	注射用贝利尤单抗		限:1. 在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗 ds-DNA 抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI 评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5 岁及以上患者;2. 与常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者。
83	注射用卡瑞利珠单抗		限:1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗;2. 既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗;3. 表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗;4. 既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗;5. 既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗;6. 局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗;7. 不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗;8. 局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗;9. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。

序号	药品名称	剂型	备注
84	注射用重组人凝血因子Ⅶa		限下列患者群体出血的治疗,以及外科手术或有创操作出血的防治:1. 凝血因子 VIII 或 IX 的抑制物 >5 个 Bethesda 单位(BU)的先天性血友病患者;预计对注射凝血因子 VIII 或凝血因子 IX,具有高记忆应答的先天性血友病患者;2. 获得性血友病患者;3. 先天性凝血因子 VII(FVII)缺乏症患者;4. 具有血小板膜糖蛋白 IIb-IIIa(GPIIb-IIIa)和/或人白细胞抗原(HLA)抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。
85	来那度胺	口服常释剂型	限:1. 与地塞米松合用,治疗此前未经治疗且不适合接受移植的多发性骨髓瘤成年患者;2. 与地塞米松合用,治疗曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者;3. 与利妥昔单抗合用,治疗既往接受过治疗的滤泡性淋巴瘤(1-3a级)成年患者。
86	曲妥珠单抗	注射剂	
87	雷替曲塞	注射剂	
88	康替唑胺片		限对本品敏感的金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感和耐药的菌株)、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的复杂性皮肤和软组织感染。
89	苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液		限对奈诺沙星呈现敏感的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的成人(≥18岁)社区获得性肺炎。
90	注射用两性霉素 B 胆固醇硫酸酯复合物		限患有深部真菌感染的患者;因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量的两性霉素 B 的患者,或已经接受过两性霉素 B 治疗无效的患者均可使用。
91	注射用磷酸左奥硝唑酯二钠		限:1. 肠道和肝脏严重的阿米巴病;2. 奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术后感染;3. 预防外科手术导致的敏感厌氧菌感染。
92	注射用英夫利西单抗		
93	重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	注射剂	
94	艾考恩丙替片		限艾滋病病毒感染。
95	比克恩丙诺片		限艾滋病病毒感染。
96	艾诺韦林片		限艾滋病病毒感染。
97	拉米夫定多替拉韦片		限艾滋病病毒感染。

序号	药品名称	剂型	备注
98	羟乙磺酸达尔西利片		限:1. 激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者;2. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗;3. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。
99	乌帕替尼缓释片		限:1. 12 岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗;2. 活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗;3. 中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗;4. 对一种或多种 TNF 抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者;5. 对一种或多种 TNF 抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性克罗恩病成人患者。
100	人凝血酶原复合物		
101	达沙替尼		
102	利司扑兰口服溶液用散		限治疗 16 日龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)。
103	甲磺酸奥希替尼片		限:1. IB—IIIA 期存在表皮生长因子受体(EGFR)外显子 19 缺失或外显子 21(L858R)置换突变的非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗,患者须既往接受过手术切除治疗,并由医生决定接受或不接受辅助化疗;2. 具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子 19 缺失或外显子 21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗;3. 既往经 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者的治疗。
104	人凝血因子Ⅸ		限凝血因子Ⅸ缺乏症(B型血友病)患者的出血治疗。
105	醋酸艾替班特注射液		限成人、青少年和≥2 岁儿童的遗传性血管性水肿(HAE)急性发作。
106	尼洛替尼胶囊		限:1. 新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者及 2 岁以上的儿童患者;2. 既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者以及慢性期 2 岁以上的儿童患者。

调出门诊特定药品名单

序号	药品名称	备注
1	艾尔巴韦格拉瑞韦片	